


ブレステスト(尿素呼気試験)

■検査日時: 年 月 日 () :

息を専用のバッグに採取し、ピロリ菌感染の有無を調べる検査です。

【原理】



ピロリ菌がいる場合、服用した尿素と水は、ピロリ菌の産生するウレアーゼにより二酸化炭素とアンモニアに分解されます。
空気中の二酸化炭素と識別できるように、尿素の炭素原子には目印がついています。

【検査の流れ】

- ①息を採取バッグに吹き込みます。
- ②ユービット錠を服用します。
- ③服用から20分後の息を採取バッグに吹き込みます。



【注意事項】

- ・ピロリ菌の除菌判定目的で実施される場合、当院では除菌薬を飲み終えてからこの検査まで最低でも6週間以上の期間を空けてから受けていただいております。
- ・検査の5時間前から禁食。検査の1時間前まで飲水可(水のみ可、他はダメ)。
(普段服用している薬がある方はご相談ください)
- ・検査前の喫煙は控えてください。
- ・お薬によっては、効果判定に影響を与える場合がありますので休薬が必要です。
胃薬
(タケキャブ、タケプロン、ネキシウム、パリエット、オメプラール、アルサルミン、ガストローム等)
抗生物質全般
ビスマス塩製剤(下剤:次硝酸ビスマスには抗菌薬の成分が含まれています)
- ・妊娠中、授乳中の方はお申し出ください。

■結果説明日時: 年 月 日 () :
